



Hygiënisch handelen bij biggen in de kraamstal

Om te vermijden dat ziektekiemen zich tussen tomen verspreiden door het manipuleren en injecteren van biggen neem je hygiënische maatregelen.



- ✓ **Beperk het aantal manipulaties en groepeer verschillende handelingen.**
- ✓ **Voer de handelingen pas uit nadat de biggen biest opgenomen hebben.**
- ✓ **Zorg voor een propere behandelkar en materiaal en reinig en ontsmet alles na elk gebruik.**
- ✓ **Wissel of ontsmet het materiaal en je handschoenen tussen tomen.**
- ✓ **Manipuleer tomen bij pleegzeugen en zieke tomen als laatste.**

IJzer toedienen



- ✓ **Dien ijzer toe op de 3de of 4de dag.**
- ✓ **Gebruik propere spuit en scherpe naalden en wissel deze minstens per toom.**
- ✓ **Controleer samen met je dierenarts regelmatig het effect van de toediening.**

Tanden slijpen

Door de scherpe hoektanden te slijpen, kan je wondjes aan de uier of de kaken van de biggen voorkomen. Doe dit echter niet routinematig, bespreek het met je dierenarts.



- ✓ **Slijp de hoektanden zo snel mogelijk.**
- ✓ **Gebruik een propere en goed functionerende tandenslijper.**
- ✓ **Slijp enkel de puntjes van de hoektanden, maak geen wondjes.**
- ✓ **Zorg dat na het slijpen geen scherpe randen meer overblijven.**

Chirurgisch castreren



- ✓ **Verdoof de beertjes lokaal en maak hiervoor een schriftelijk akkoord op met je dierenarts.**
- ✓ **Gebruik pijnstillers.**
- ✓ **Castreer binnen de 7 dagen na de geboorte.**
- ✓ **Maak gebruik van 2 mesjes waarbij je telkens wisselt tussen het mesje dat in gebruik is en het andere dat in ontsmetting wordt geplaatst.**

HYGIËNISCH HANDELEN

**MEER BOERENVREUGDE
IN DE KRAAMSTAL**